

אמטריקס

תמייסה לציופרוניים

אמטריקס

محلול للأظافر

يجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال
تعليمات الاستعمال

المحتوى: امتریکس، 10 مل

المكونات:

Propylene Glycol, Urea, Glycerol, Lactic Acid, Water, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA.

الوصف:

امتریکس هو سائل رائق عديم اللون، مزود بضمن أنيوية بلاستيك ذات فوهة سيليكون، التي تساعد في دهن المادة على الأظافر. امتریکس خالي من المواد الحافظة وعديم الرائحة. المكونات تفكك كاملاً من تقاء نفسها.

الاستطباب:

المعالجة للأظافر المصابة بتلوث فطري (فطر الأظافر) أو بداء الصدفية. امتریکس يحسن من ظهور الأظافر التي تغير لونها وشكلها الطبيعي. امتریکس هو ذو تأثير فعال على الطبقية القرنية ويحل الخلايا الفطرية التي عادة تسبب لتلوث فطري في الأظافر. امتریکس يزيد الإマاهة، ينعم بلطف النطبقات الخارجية للوجه الظفر وذلك بواسطة تغيير البنية المجهزة للظفر وتحسين كمالية سطح الظفر، يحافظ على الظفر بحالة جيدة. تظهر عادة العلامات الأولى للتحسن بعد 1-2 أسابيع من العلاج.

ارشادات الاستعمال:

إدهن/ اي امتریکس على الأظافر المصابة مرة في اليوم، يفضل في المساء، حالاً قبل اللون، أنسكاك الأنيوية ووكي/ اي الفوهة إلى الظفر. اضف/ اي بشكل خفيف على الأنيوية ويعتبر المحلول بواسطة الفوهة. غسل/ اي كل ظفر بطريقة دقيقة من المحلول من المهم دهن المحلول أيضاً من تحت النهايات الحرية للأظافر المصابة. بعد الدهن يجب ترك المفعول الجاف لمدة عدة دقائق. بالإضافة رؤية علامات أولية من بعد 1-2 أسابيع علاجية. تغير قترة العلاج حسب حالة الوضع البادي لكن، في حالات كثيرة يتطلب الأمر 6-3 أشهر علاجية. للحصول على نتائج مثلية يجب الاستمرار في العلاج حتى يندو فطر سليم. لا يجوز الدهن على فرشاة الظفر إذا اغسل المفعول المصاص أو أجزاء منه عن فرشاة الظفر. يجب تجنب استعمال طلاء الأظافر أثناء العلاج خشية الإضرار بالتأثير المرغوب لامتریکس.

لـ امتریکس فعل موضعي فقط لذلك بالإمكان إستعماله في قترة الحمل والرضاعة. توجد خبرة محدودة لدى الأطفال، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل علاجه.

تحذيرات:

للإستعمال الخارجي فقط. تجنب/ اي التماس العينين أو الأغشية المخاطية. لا تستعمل/ اي المستحضر إذا كنت حساسة لأحد المكونات.

أعراض جانبية ممكنة:

تبيّح خفيف وعابر للجلد المجاور للظفر وكذلك تغيرات في لون الظفر يمكن أن تظهر عند بعض المعالجين. بالإضافة، من الممكن أن يحدث تخلخل/[انفصال الظفر عن فرشاة الظفر (خلخلة الظفر) (onycholysis)]، يشمل إنفصال القسم المصاص من الظفر.

فترقة الصلاحية والت تخزين:

يُستعمل/ اي حتى إنقضاء تاريخ الصلاحية الذي يظهر على الأنوية وعلى علبة الكترون الخارجية.

يجب التخزين بين 25-2 درجة مئوية. يجب الحماية من ضوء الشمس والتجميد.

المنتج: موبريج فارما AB، بروما، السويد

المستورد وصاحب الإمتياز: وكالات بيريوجو إسرائيل، م.ض.،
شارع راكيفت 1، شوهرام، إسرائيل
هاتف رقم: 1-800-388-288

رقم السجل في وحدة الأدوية والأجهزة الطبية في إسرائيل: 1320404

יש להתייעץ עם הרופא לפני השימוש

הוראות שימוש

תכולה: אמטריקס, 10 מ"ל

מרכיבים:

Propylene Glycol, Urea, Glycerol, Lactic Acid, Water, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA.

תיאור:

אמטריקס הוא נוזל צלול סר-צבע, המסופק בשפופרת פלסטיק בעלת פייט סיליקון, המסייעת במריחת החומר על הציופרין. אמטריקס נטול חומרים שמשמרים וריח. ההורכבים מתחלים במלאם.

התוויה:

טיפול בציופרונים הנגועות בזיהום פטרוי (פטרור והציפוריים) או בעורוראים.

אמטריקס משפר מראה ציפורניים שניהם את צבען וצורתן הטבעית.

אמטריקס הוא בין השענה קטליטיות פיזיקלית ומפרק את התאים.

הפטוראים מבקרים את ההידריה, מהליק בעקבות הפטוראים.

אמטריקס מברי את החומרת הידריה, עלי-ידי שני הרכיבים מתקדמים

החויזנות של לחות הציפוי ועל-ידי הרכיבים מתקדמים משבצות של הציפוי ושפיר שלמות פנ' השטח הציפוי, שורר על היצוף במצב טוב. סימנים ראשוניים להטבה נראים בדרך כלל לאחר 1-2 שבועות

של טיפול.

אופן השימוש:

מרחף/ אמטריקס על הציופרונים הנגועות עם זיהום, עדיף בעבר, מיד לפני השינה. אחורי/ בשפופרת וכוכו/ את הפיה אל הציופר. לחץ/ נקלות על שפופורת וצדלו/ את התמייסה בעורת הפיה. כוכו/ כל ציפורן בשכבה דקה של התמייסה. חשוב למרוח את התמייסה גם מהתחלת לקנות החופשיים של הציופרונים הנגועות. לאחר המריחה

של הנחיה ציפויו להתייבש במשך כמה דקות.

ניתן לאות גזימים ראשונים לשטחה לאחר 1-2 שבועות טיפול. משך הטיפול משתנה בהתאם לחומרת המבצת ההתחלה אף, במקרים רבים ידרשו 6-3 חודשים טיפול להשתתת תושאות מיטוביות יש להמשיך

בטיפול עד אשר ציפויו בראייה אודם. אין מלהרך אמטריקס ממנה נפרדו מטיטת הציופרין.

יש להמען אטמיושblk במקביל לטיפול וחחש לפגעה בעוריות.

הרוץיה של אמטריקס.

לאמטריקס עליות מקומיות בלבדvr שניתן להשתמש בו בהרין

ונרגנה.

קיים פיסיון מוגבל לילדים, אך יש להיוועץ ברופא לפני הטיפול בהם.

اذ呵روות:

לשימוש חיצוני בלבד. מנע/ מגע עם העיניים או מברשות ריריות. אל השתמשם/ בכיסוי אם היר אלרגיה לאחד ממרכיבים.

תופעות לוואי אפשריות:

גירוי קל וולוף של העור הסמור לציפויו וכן טמיון בצעב הציופרין

יכולים להופיע חלק מהמתופלים. במקרה, ניתן התפקידו/

הירידות של הציופר מטיטת הציופר (onycholysis), כולל הינתקות

של החלק הנגע של הציופרין.

חמי מד ואחסנה:

השתמשם/ עד תאריך התפוגה המופיע על השפופרת ועל אריזת

הקרטון החיצוני.

של לאחסן בין 25°C - 2°C. הגן/ מאור שמש והקפאה.

שם/ מוחץ להישג ידם של ילדים.

יערכ: מובריג פארמה AB, ברומה, שוודיה

יבוא ובעל הרשות: פרוג' ישראל סוכנות בע"מ,

רחוב רוקפת 1, ירושה, ישראל

טלפון: 1-800-388-288

מספר רישום אמ"ד בישראל: 1320404

EMTRIX®

Nail solution

Consult the doctor before use

INSTRUCTIONS FOR USE

CONTENTS: Emtrix, 10 ml

INGREDIENTS: Propylene Glycol, Urea, Glycerol, Lactic Acid, Water, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA.

DESCRIPTION:

Emtrix is a clear, colourless liquid supplied in a plastic tube with a silicone drop tip to facilitate application to the nail. Emtrix is free from preservatives and fragrances. The ingredients are fully biodegradable.

INDICATION:

For treatment of nails affected by fungal infection (onychomycosis) or psoriasis.

Emtrix improves the appearance of discoloured and deformed nails. Emtrix has a physical keratolytic effect and degrades the cells of fungi that typically cause fungal nail infection.

Emtrix increases hydration, gently smoothes the outer layers of the nail plate and, by changing the nail's microenvironment and improving nail surface integrity, keeps nail in good condition. First signs of improvement are normally seen after 1-2 weeks of treatment.

USE:

Apply Emtrix once daily to affected nails, preferably in the evening just before bed time. Hold the point of the tube onto the nail. **Press lightly on the tube and spread out the solution with the point. Cover each nail with a thin layer of the solution. It is important that the solution is also applied under the free edge of any affected nails.**

After application, the nail should be allowed to dry for a few minutes.

First signs of improvement may be seen after 1-2 weeks of treatment. Duration of treatment varies according to the initial severity of the condition, but in many cases 3-6 months treatment may be required. For optimal results, continue the treatment until a normal nail has grown out. Do not apply Emtrix to the nail bed if the affected nail or parts of the affected nail has detached from the underlying nail bed.

Avoid using nail polish during treatment as the desired effect of Emtrix will be diminished.

Emtrix acts only locally and can therefore be used during pregnancy and lactation.

There is limited experience in children. Therefore, consult your doctor before treatment in children.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

For external use only. Avoid contact with eyes or mucous membranes. Do not use if you are allergic to any of the ingredients.

POSSIBLE SIDE EFFECTS:

Transient minor irritation of the skin immediately adjacent to the nail and discolouration of the nail can be expected to occur in some patients. In addition, loosening/separation of the nail from the underlying nail bed (onycholysis) may occur, including detachment of the affected part of the nail.

SHELF LIFE AND STORAGE:

Use by the date indicated on the tube and outer carton. Store between 2° and 25°C. Protect from sunlight and freezing. Keep out of reach of children.

MANUFACTURER: Moberg Pharma AB, Bromma, Sweden

IMPORTER AND REGISTRATION HOLDER:

Perrigo Israel Agencies Ltd., 1 Rakefet St., Shoham, Israel.

Telephone No.: 1-800-388-288

LICENSE NUMBER OF MEDICAL DEVICE IN ISRAEL: 1320404

Эмтрикс

Раствор для ногтей

Перед применением следует проконсультироваться с врачом

Указания к применению

Содержимое тубы: Эмтрикс, 10 мл

Компоненты: Propylene Glycol, Urea, Glycerol, Lactic Acid, Water, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA.

Описание:

Эмтрикс - это прозрачная бесцветная жидкость, которая поставляется в пластмассовой тубе, снабженной силиконовым мундштуком, помогающим смазывать ногти этим средством. Эмтрикс не содержит консервантов и лишен запаха. Его компоненты полностью разлагаются.

Показание:

Для ухода за ногтями, пораженными грибковой инфекцией (ногтевой грибок) или псориазом.

Эмтрикс улучшает внешний вид ногтей, изменивши свой естественный цвет и форму. Эмтрикс обладает физическим кератолитическим действием и разрушает споры грибка, которые обычно вызывают грибковую инфекцию ногтя.

Эмтрикс усиливает гидратацию, мягко слаживает наружный слой ногтевой пластины и за счет изменения микроскопической среды ногтя и улучшения целостности его поверхности, сохраняет ноготь в хорошем состоянии. Первые признаки улучшения могут быть замечены после 1-2 недель проведения лечения.

Метод применения:

Наносите Эмтрикс на пораженные ногти один раз в день, предпочтительнее, по вечерам, непосредственно перед отходом ко сну. Удерживайте тубу и направьте ее мундштук к ногте. Слегка сожмите тубу и распространите раствор с помощью мундштука. Покройте весь ноготь тонким слоем раствора. Важно наносить раствор также и под свободные края пораженных ногтей.

После нанесения раствора следует дать ему высокнуть в течение нескольких минут.

Признаки клинического улучшения могут быть замечены после 1-2 недель проведения лечения.

Длительность курса лечения зависит от тяжести начального состояния, но во многих случаях потребуется проводить лечение в течение 3-6 месяцев. Для достижения оптимальных результатов следует продолжать лечение до начала роста здорового ногтя. Не следует наносить Эмтрикс на ногтевое ложе, если ноготь поврежден или его часть отделена от ногтевого ложа.

В процессе лечения следует избегать нанесение лака на ногти из-за возможного нарушения терапевтического воздействия препарата Эмтрикс.

Эмтрикс оказывает только местное воздействие, поэтому можно пользоваться им в период беременности и кормления грудью.

Накоплен лишь ограниченный опыт применения препарата в лечении детей, поэтому перед началом лечения ребенка следует посоветоваться с врачом.

Предупреждение:

Только для наружного применения. Избегайте контакта препарата с глазами или слизистыми оболочками. Не применяйте препарат, если у Вас имеется аллергия к одному из его компонентов.

Возможные побочные явления: У некоторых пациентов могут возникать легкое и преходящее раздражение кожи вокруг ногтя, а также изменение цвета ногтя. Помимо этого, возможно ослабление/отделение ногтя от подногтевого ложа (onycholysis), включая полное отделение пораженной части ногтя.

Срок годности препарата и его хранение:

Применяйте препарат только до даты истечения срока его годности, которая отмечена на тубе и на его картонной упаковке.

Следует хранить препарат при температуре от 2°C до 25°C. Оберегайте его от прямого воздействия солнечных лучей и от замораживания. Храните в недоступном для детей месте.

Производитель: Моберг Фарма АБ, Бромма, Швеция

Импортер и Владелец лицензии: Перриго Израиль Агентства ЛТД, Ул. Ракефет 1, Шохам, Израиль

Телефон: 1-800-388-288

Номер лицензии медицинского изделия в Израиле: 1320404